

Arithmetik/ Algebra T2

Lösungen:

$$1. \quad a) \quad \frac{6a+18-ab-3b}{a^2+6a+9} = \frac{(a+3)(6-b)}{(a+3)^2} = \frac{6-b}{\underline{a+3}}$$

Faktorisieren ½ Punkt und Lösung ½ Punkt.

$$b) \quad \frac{x+1}{x-2} - \frac{x+2}{x+3} = \frac{(x+1)(x+3)}{(x+2)(x+3)} - \frac{(x+2)^2}{(x+3)(x+2)} = \frac{(x+1)(x+3) - (x+2)^2}{(x+3)(x+2)} = \frac{x^2+4x+3-x^2-4x-4}{(x+3)(x+2)} = \frac{-1}{\underline{(x+3)(x+2)}}$$

Erweiterung ½ Punkt und Lösung ½ Punkt.

2. a)

$$4x(x-1) - (2x+3)^2 = 1$$

$$4x^2 - 4x - (4x^2 + 12x + 9) = 1$$

$$4x^2 - 4x - 4x^2 - 12x - 9 = 1 \quad 1 \text{ Punkt}$$

$$-16x = 10$$

$$x = \frac{-10}{16} = -\frac{5}{8}$$

b)

$$\frac{x}{3} + 6 = 5$$

$$\frac{x+18}{3} = \frac{15}{3}$$

1 Punkt

$$x+18 = 15$$

$$x = -3$$

3. a) Lösung Prozente:

$$100 - (100 \cdot 0.85 \cdot 0.8) = 32g$$

100g frische Zwetschgen ergeben 32g gedörrte Zwetschgen (½ Punkt)

$$\frac{1800 \cdot 100}{32} = 5'625g \quad \text{Endresultat: 5.625kg}$$

Man braucht 5.625kg frische Zwetschgen um 1.8kg gedörrte Zwetschgen zu erhalten. (½ Punkt)

b) Lösung Zinsen

(ergibt je ½ Punkt, direkt 1 Punkt)

Der Kaufpreis beträgt rund CHF 4545.45

Der Neupreis beträgt CHF 11'363.65

4. Nur vollständig richtig je 1/2 Punkt .

a) $2a + 3b - (3a - 2b - (a + b)) = 2a + 3b - (3a - 2b - a - b) = 2a + 3b - 3a + 2b + a + b = 6b$

b) $(y - 3)(y + 3) + 9 = y^2 - 9 + 9 = y^2$

c) $4xy - (2x - y)^2 = 4xy - (4x^2 - 4xy + y^2) = -4x^2 + 8xy - y^2$

d) $\sqrt{a^3} \cdot \sqrt{a} \cdot a \cdot a^2 = \sqrt{a^4} \cdot a^3 = a^2 \cdot a^3 = a^5$

5. a) 45 Liter

b) 40 Liter : 500km = 0.08 l/km → pro 100 km: 8 Liter

c) Auf der 1. Teilstrecke zwischen 0 und 200 km.

Dort ist das Gefälle des Graphen am kleinsten, d.h. der Inhalt des Tanks nimmt pro km am wenigsten schnell ab.

d) (5+40+25) Liter : 1000 km = 0.07 l/km → pro 100 km: 7 Liter

Der Benzinverbrauch auf der Gesamtstrecke beträgt 7 Liter pro 100 km

Korrektur: 2 Punkte: jede Teilaufgabe je 1/2 Punkt .

6. a) Beispiel: Lösungsweg mit Tabelle

	1	2	3	4	5
1	X	✓	✓	✓	✓
2	X	X	✓	✓	✓
3	X	X	X	✓	✓
4	X	X	X	X	✓
5	X	X	X	X	X

Daraus folgen **10** Spiele

0.5 Punkt

b) Beispiel: Lösungsweg mit Tabelle

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
6	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓
7	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
8	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Daraus folgen **45** Spiele

0.5 Punkt

c) Die Aufgabe kann wieder mit einer Tabelle gelöst werden oder man leitet durch die vorgängigen Aufgaben die Formel her:

$$k = \frac{n \cdot (n-1)}{2} = \frac{60 \cdot (60-1)}{2} = \mathbf{1770}$$

Mögliche Begründung zur Formel:

Ein Teilnehmer spielt gegen jeden einmal, daraus folgen n-1 Spiele für den Teilnehmer. Multiplizieren wir diese Anzahl Spiele mit der Anzahl Teilnehmer n(n-1), erhalten wir doppelt so viel Spiele, da jeder zweimal gegeneinander spielen würde. Somit muss man noch durch zwei dividieren.

1 Punkt